



## バット・ストライク!?!にご注意を

2016年3月2日発行 IFALPA Safety Bulletin より

### 概要

オーストラリアの3つの空港（ブリスベン・ケアンズ・シドニー）において、ある時間帯に大量のコウモリが一気に飛来し、航空機と衝突する可能性がある、という内容の Safety Bulletin が IFALPA より発行されました。

主な記載事項は、以下の通りです。

- ・活発な活動時期は例年12月から6月までで、とりわけ3月と4月は大量に飛来する。
- ・通常、活発に活動する時間帯は、日没時の10～25分間とされている。
- ・花火や音波を使用して追い払う対策を講じるも、その数が多すぎて効果がない。
- ・空港が行うべき最も効果的な対策は、「早く検知し、早く運航者に注意喚起する」ことである。

幸いなことに、洞窟などから一気に飛び立つ“Fly Out”と一気に戻る“Fly In”は、同じ時間帯に行われる習性があります。その為、この情報が ATIS や NOTAM で通報されることで、パイロットはタイムリーに知ることが出来ます。万が一、コウモリの群れに衝突した場合は、ATC へ速やかに連絡する事や、DNA サンプルを採取するまで機体を清掃しない事などが求められます。

この Safety Bulletin の本文は ALPA Japan HP [www.alpajapan.org](http://www.alpajapan.org) をご参照下さい。

以上

(参考：オーストラリアのコウモリ)



黒コウモリ

体長: 153～191mm

体重: 500～1,000g



グレイヘッドコウモリ

体長: 152～177mm

体重: 600～1,000g



リトルレッドコウモリ

体長: 117～155mm

体重: 300～600g